

## De Beslisschijf

### Besluitvorming in de palliatieve fase door middel van Palliatief Redeneren



fase

2

- Benoem problemen en stel werkhypothesen op
- Maak beleidsafwegingen
- Overweeg consultatie en/of aanvullend onderzoek
- Formuleer doel beleid
- Stel plan van aanpak op:
  - behandeling oorzaak
  - symptomatische behandeling
  - ondersteunende zorg
- Denk toekomstgericht!

Stem af met patiënt en naasten  
Overweeg gebruik meetinstrumenten



Vat problematiek samen en maak proactief beleid





fase

3

- Evalueer:
  - spreek af hoe, door wie en wanneer het effect gemeten en besproken wordt
  - meet effect aan de hand van klachten en problemen, de beleving ervan, functioneren en welbevinden

Stem af met patiënt en naasten  
Overweeg gebruik meetinstrumenten



fase

4

- Stel effect vast:
  - effect goed:
    - blijf periodiek evalueren → ga terug naar fase 3
  - effect afwezig of beperkt:
    - stel beleid bij → ga terug naar fase 2
    - breng situatie opnieuw in kaart en stel werkhypothese bij → ga terug naar fase 1
    - accepteer

Stem af met patiënt en naasten  
Overweeg gebruik meetinstrumenten



Stel beleid zo nodig bij en blijf evalueren

